



國立成功大學附設醫院  
核子醫學科

18號衛教單

檢查  
名稱  
靜脈攝影  
Venography

檢查  
地點  
住院大樓(舊棟)一樓核子醫學科  
(請詳核醫地點圖示)

聯絡  
電話

(06)2353535-2470、2471

主要目的  
一、診斷是否有深部靜脈栓塞。

檢查流程

- 一、核醫科報到後，請至前方等候區等候，檢查前會有醫護人員會呼叫並核對您的名字。
- 二、注射室安置靜脈留置針於雙腳，接著至造影室，放射師會指示您平躺於檢查床上，醫護人員會從靜脈注射藥物：Tc-99m MAA。
- 三、注射後立刻進行靜脈造影，本檢查需靜躺 20-30 分鐘，檢查中會使用止血帶束縛雙腳膝蓋下方與腳踝上方，雙腳有腫脹酸痛感，請多加忍耐盡量不動。
- 四、若是無法配合檢查之嬰幼兒，則需給予鎮靜劑入睡後才能執行上述之檢查，檢查完成後待嬰幼兒醒來經醫師評估才可離開，回家應觀察嬰幼兒睡眠狀況，如有異狀應立即回院觀察。

注意事項

- 一、本檢查不需禁食，生活作息如常。
- 二、為避免對影像結果造成誤判，您身上所有外來物(包含零錢、項鍊、皮帶等金屬製品)造影前需先取下。
- 三、因為注射之藥物含有少量放射性，有懷孕可能或正在哺乳期間之受檢者，請務必事前告知排程人員，以維護本身及嬰幼兒、胎兒之安全。
- 四、注入體內之放射性同位素為人體代謝類似物，極少會發生過敏反應。
- 五、因檢查所需之放射性同位素藥物具有時效性(其時效性極短且非常昂貴)，為免醫療資源浪費，請於受檢當日準時報到；倘若該日不克至本科受檢，請於受檢前兩個工作天通知本科，以利更改日期。
- 六、本科影像掃描所給予的藥物含有少量的放射線，病患受檢時與家中孕婦或未滿 12 歲小孩應盡量保持 1-2 公尺距離，時間約 1 天。

發行日期： 109.04.17