

	國立成功大學附設醫院 核子醫學科		5號衛教單
檢 查 名 稱	腸胃道出血造影檢查 G-I Bleeding Study		
檢 查 地 點	住院大樓(舊棟)一樓核子醫學科 (請詳核醫地點圖示)	聯 絡 電 話	(06)2353535-2470、2471
主要目的	部分病患腸胃道出血的位置是胃鏡及大腸鏡檢查所無法偵測的，因此藉由核子醫學科腸胃道出血掃描找到出血的時機及位置。		
檢查流程	一、核醫科報到後，請至前方等候區等候，檢查前有醫護人員會呼叫並核對您的名字。 二、先至注射室醫護人員會先留置靜脈留置針在您身上，並由留置針頭注射藥物：Cold-PYP。 三、請在等候區等候約 15-30 分鐘左右，放射師會出來呼叫、核對您的名字並通知您先解小便後至核醫造影室，造影時護理人員由留置針頭注射 Tc-99m pertechnetate 至您的身上，並同時進行造影，檢查中並不會有任何不適。 四、以長時間、間斷性的腹部照影，直到找到出血點或醫師決定檢查結束為止，時間會超過 6 小時以上(視狀況有時需做第 24 小時的影像比對)。造影檢查只需靜靜躺著，並不會有任何不適。		
注意事項	一、本檢查不需禁食，生活作息如常。 二、為避免對影像結果造成誤判，您身上所有外來物(包含零錢、項鍊、皮帶等金屬製品)造影前需先取下。 三、因為注射之藥物含有少量放射性，有懷孕可能或正在哺乳期間之受檢者，請務必事前告知排程人員，以維護本身及嬰幼兒、胎兒之安全。 四、注入體內之放射性同位素為人體代謝類似物，極少會發生過敏反應。 五、因檢查所需之放射性同位素藥物具有時效性(其時效性極短且非常昂貴)，為免醫療資源浪費，請於受檢當日準時報到；倘若該日不克至本科受檢，請於受檢前兩個工作天通知本科，以利更改日期。 六、本科影像掃描所給予的藥物含有少量的放射線，病患受檢時與家中孕婦或未滿12歲小孩應盡量保持1-2公尺距離，時間約1天。 七、 <u>本科「核醫造影檢查」遇天然災害停班(台南市或高雄市任一市)時暫停服務，因停班造成無法到檢，本科會於上班日連絡重新排檢，敬請見諒。</u>		
發行日期：	115.08.31		