

	國立成功大學附設醫院 核子醫學科		26 號衛教單
檢 查 名 稱	膀胱輸尿管尿逆流 Vesicoureteral Reflux		
檢 查 地 點	住院大樓(舊棟)一樓核子醫學科 (請詳核醫地點圖示)	聯絡 電話	(06)2353535-2470、2471
主要目的	一、評估是否有尿路逆流。		
檢查流程	一、檢查前 30 分鐘請喝 300-500cc 的水。 二、核醫科報到後，請至前方等候區等候，檢查前有醫護人員會呼叫並核對您的名字。 一、由臨床醫師決定是以直接或間接方式做檢查，如為直接方式則會請醫師與護理師協助放置導尿管。 二、導尿管放置完成，會帶您至造影室，醫護人員會接點滴至導尿管，將加有核醫藥物：Tc-99m DTPA 的點滴經由導尿管灌入膀胱，並立即開始造影，本次造影須靜躺約 1-2 小時，檢查中並不會有任何不適。 五、如為間接方式，醫護人員會由您的靜脈注射核醫藥物：Tc-99m DTPA 和 Lasix(依醫師評估是否需要)，注射完後持續補充水分並請您於第漲尿時告知檢查人員，放射師會請您去造影室立即開始造影，造影時間一般約為 2 分鐘，膀胱脹尿到造影的步驟須重複 2~3 次操作，檢查的方式須以邊解尿邊造影(拿尿壺或坐尿盆)。 六、若是無法配合檢查之嬰幼兒，則需給予鎮靜劑入睡後才能執行上述之檢查，檢查完成後待嬰幼兒醒來經醫師評估才可離開，回家應觀察嬰幼兒睡眠狀況，如有異狀應立即回院觀察。		
注意事項	一、本檢查不需禁食，生活作息如常。 二、檢查前 30 分鐘請喝 300-500cc 的水，檢查時間約 2 小時。 三、需視臨床醫師要求，必要時需插導尿管。 四、為避免對影像結果造成誤判，您身上所有外來物(包含零錢、項鍊、皮帶等金屬製品)造影前需先取下。 五、因為注射之藥物含有少量放射性，有懷孕可能或正在哺乳期間之受檢者，請務必事前告知排程人員，以維護本身及嬰幼兒、胎兒之安全。 六、嬰幼兒如因配合檢查需要鎮靜者，請於檢查前勿讓小朋友睡覺，檢查前會予以灌睡。 七、 注入體內之放射性同位素為人體代謝類似物，極少會發生過敏反應。 八、<u>本科「核醫造影檢查」遇天然災害停班(台南市或高雄市任一市)時暫停 服務，因停班造成無法到檢，本科會於上班日連絡重新排檢，敬請見諒。</u>		
發行日期:115.08.31			