

	<p style="text-align: center;">國立成功大學附設醫院 核子醫學科</p>		<p style="text-align: center;">10-1 號衛教單 非I-131 治療者適用</p>
<p>檢 查 名 稱</p>	<p><b>碘-131 全身性攝影</b> <b>I-131 Whole Body Scan</b></p>		
<p>檢 查 地 點</p>	<p>住院大樓(舊棟)一樓核子醫學科 (請詳核醫地點圖示)</p>	<p>聯絡 電話</p>	<p><b>(06)2353535-2470、2471</b></p>
<p>主要目的</p>	<p>一、甲狀腺癌開刀後追蹤檢查 二、碘-131 治療後追蹤檢查</p>		
<p>檢 查 流 程</p>	<p>一、核醫科報到後，請至前方等候區等候，檢查前有醫護人員會呼叫並核對您名字。 二、至注射室，醫護人員服藥前會與您做相關衛教及注意事項，衛教完後服用核醫藥物：I-131 3mci，服藥後即可先行離開，依醫護人員跟您約定的時間再回來造影(通常會跟您約定服用I-131 藥物後 3 日回來造影)。 三、依照約定時間報到，至等候區等候，會有放射師出來呼叫、核對您的名字並通知您先解小便後至核醫造影室。 四、依放射師指示靜躺檢查床上造影約 40 分鐘，檢查中並不會有任何不適。</p>		
<p>注 意 事 項</p>	<p>一、孕婦絕對不可接受此檢查。 二、未接受過甲狀腺切除手術者不可接受此檢查。 三、檢查前需依照醫囑停止服用甲狀腺素藥物及避免食用高碘食物(例如海帶、紫菜、海苔、深海魚、海貝類和乳酪製品等)。於原子碘治療前一個月內不可接受放射診斷檢查(例如電腦斷層掃描)使用的顯影劑 四、三天內儘量勿與孕婦及十六歲以下者接近(二公尺以上距離)。 五、因排出之尿液、糞便內含有放射性物質，故服藥三天內，每次大小便後馬桶須沖水三次以上，返家初期所產生廢棄物(如衛生紙或尿布)仍可能含有些許輻射劑量，建議請先存放家中角落 3 天後再丟棄。 六、檢查前需禁食 4 小時(包含水跟藥)，服原子碘 2 小時以上才可吃東西，以利原子碘的吸收。 七、女性病患於服用原子碘後，半年內不可懷孕，男性病患於服用原子碘後，四個月內不可使配偶懷孕。 八、女性病患於服用原子碘後，若有餵乳者，三個月內不可餵乳。此外，有餵乳者，建議已停止餵乳 2 個月以上，才接受此檢查。 九、其他藥物須延至原子碘服用後四小時才服用。 十、請注意不要用力碰觸脖子。 十一、若對疾病有不瞭解，請與開檢查單的醫師討論。 對以上事項有疑問處，請諮詢核醫護人員、醫師。</p>		

發行日期：115.03.20