

	國立成功大學附設醫院 核子醫學科		23號衛教單
檢 查 名 稱	陰囊攝影 Scrotal Scan		
檢 查 地 點	住院大樓一樓核子醫學科	聯絡 電話	(06)2353535-2470、2471
主要目的	一、區分睪丸扭轉和急性副睪炎。 二、偵測造成男性不孕症之精索靜脈曲張(varicocele)。		
檢查流程	一、核醫科報到後，請至前方等候區等候，檢查前有醫護人員會呼叫並核對您的名字。 二、先至注射室，醫護人員會在您身上放置靜脈注射留置針。並由靜脈留置針頭注射藥物：cold-PYP。 三、請在等候區等候約 15-30 分鐘左右，放射師會出來叫號並核對您的名字後引導至攝影室造影，造影時護理人員由留置針頭注射核醫藥物：Tc-99m pertechnetate，並同時進行造影，造影時需以站立方式檢查，如為無法配合站立之嬰幼兒則平躺於床上造影，時間約 20-30 分鐘，檢查中並不會有任何不適。完成檢查後，醫護人員會幫您拔除靜脈留置針。 四、若是無法配合檢查之嬰幼兒，則需給予鎮靜劑入睡後才能執行上述之檢查，檢查完成後待嬰幼兒醒來經醫師評估才可離開，回家應持續觀察嬰幼兒睡眠呼吸有無異狀，如有異狀應立即回院觀察。		
注意事項	一、本檢查不需禁食，生活作息如常 二、本檢查以站姿造影，如嬰幼兒無法配合者，才以平躺檢查床上方式造影。 三、為避免對影像結果造成誤判，身上所有外來物(包含零錢、項鍊、皮帶等金屬製品)造影前需先取下。 四、因為注射之藥物含有少量放射性，有懷孕可能之陪伴者，請務必事前告知排程人員，以維護本身之安全。 五、嬰幼兒如因配合檢查需要鎮靜者，請於檢查前勿讓小朋友睡覺，檢查前會施予鎮靜灌睡。 六、 注入體內之放射性同位素為人體自行代謝，極少會發生過敏反應。 七、因檢查所需之放射性同位素藥物具有時效性（其時效性短且非常昂貴），為免醫療資源浪費，請於受檢當日準時報到；倘若該日不		

	克至本科受檢，請於受檢前兩個工作天通知本科，以利更改日期。 八、本科影像掃描所給予的藥物含有少量的放射線，病患受檢時與家中孕婦或未滿 12 歲小孩應盡量保持 1-2 公尺距離，時間約 1 天。 九、本科「核醫造影檢查」遇天然災害停班(台南市或高雄市任一市)時暫停服務，因停班造成無法到檢，本科會於上班日連絡重新排檢，敬請見諒。
發行日期：<u>115.08.31</u>	