

	<p style="text-align: center;">國立成功大學附設醫院 核子醫學科</p>		<p style="text-align: center;">20號衛教單</p>
<p style="text-align: center;">檢 查 名 稱</p>	<p>骨髓炎/人工關節鬆動造影檢查 Study for osteomyelitis / Painful Prosthesis</p>		
<p style="text-align: center;">檢 查 地 點</p>	<p>住院大樓(舊棟)一樓核子醫學科 (請詳核醫地點圖示)</p>	<p style="text-align: center;">聯 絡 電 話</p>	<p style="text-align: center;">(06)2353535-2470、2471</p>
<p style="text-align: center;">主要目的</p>	<ol style="list-style-type: none"> 一、 協助鑑別診斷骨髓炎或蜂窩組織炎 二、 協助診斷人工關節鬆動及感染。 三、 協助鑑別診斷其他骨骼關節疾病。 		
<p style="text-align: center;">檢查流程</p>	<ol style="list-style-type: none"> 一、 核醫科報到後，請至前方等候區等候，檢查前有醫護人員會呼叫並核對您的名字。 二、 先至注射室，醫護人員會在您身上留置靜脈留置針。 三、 在等候區候檢，放射師會請您至造影室，依指示平躺於檢查床上，醫護人員會在您身邊從留置針頭注射藥物：Tc-99m MDP，並開始進行第一次造影檢查，本次檢查需靜躺15-20分鐘，檢查過程中並不會有任何不適。 四、 第一次造影結束後，放射師會和您約定第二次造影的時間(須等候約3小時左右，等待時間可自行活動並可正常進食)。 五、 第一次造影結束後須開始立即補充飲水1000~2000c.c. (洗腎及限水的病人除外)，以利下午第二次造影讓影像可以更清楚。 六、 依約定時間在等候區候檢，輪到您時，放射師會核對您的名字並通知您先解小便後再至核醫造影室，第二次造影須靜躺約20-30分鐘，檢查過程中並不會有任何不適。 七、 第二次造影結束後，請至等候區等候，醫護人員會呼叫、核對您的名字並為您從靜脈留置針頭注射核醫藥物Ga(鎳)-67，注射完後會拔除留置針，醫護人員會與您約定造影時間並給您造影回聯通知單(通常是注射日後2-3天回來照相)。 八、 依照約定時間至核醫科投回聯通知單，至等候區等候，放射師會核對您的名字，並通知您先解小便再至核醫造影室，本次造影須靜躺約20-30分鐘，檢查中並不會有任何不適。 		
<p style="text-align: center;">注意事項</p>	<ol style="list-style-type: none"> 一、 本檢查不需禁食，生活作息如常。 二、 為避免對影像結果造成誤判，您身上所有外來物(包含零錢、項鍊、皮帶等金屬製品)造影前需先取下。 三、 因為注射之藥物含有少量放射性，有懷孕可能或正在哺乳期間之受檢者，請務必事前告知排程人員，以維護本身及嬰幼兒、胎兒之安全。 四、 注入體內之放射性同位素為人體代謝類似物，極少會發生過敏反應。 五、 因檢查所需之放射性同位素藥物具有時效性(其時效性極短且非常昂貴)，為免醫療資源浪費，請於受檢當日準時報到；倘若該日不克至本科受檢，請於受檢前兩個工作天通知本科，以利更改日期。 六、 本科影像掃描所給予的藥物含有少量的放射線，病患受檢時與家中孕 		

	婦或未滿12歲小孩應盡量保持1-2公尺距離，時間約3天。
--	------------------------------

發行日期： 109.04.17
